



황열 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

Protect yourself from Yellow Fever,
and make sure to follow these essential steps!



황열 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to a yellow fever-affected area?

✓ 황열 바이러스에 감염된 매개모기에 물려 감염

Yellow fever is transmitted through the bite of an infected mosquito.

✓ 발열, 두통을 동반하며 대부분 48시간 이내 완화되지만, 중증의 경우 고열, 심한 두통을 동반하며 황달과 출혈이 나타남

Symptoms include fever and headache, usually resolving within 48 hours,
but severe cases can lead to high fever, severe headache, jaundice, and bleeding.

✓ 황열 위험지역 여행 전 예방접종 여부를 확인하고, 모기에 물리지 않도록 주의!

Check for vaccination requirements before traveling to a yellow fever
risk area, and take precautions to avoid mosquito bites!

황열, 이렇게 예방하세요! ✓

How to protect yourself from yellow fever



출국 최소 10일 전
황열 백신 접종하기

Get vaccinated at least 10 days
before departure.



예방접종 이후
2주 동안 헌혈 금지

No blood donation
for 2 weeks after vaccination.

여행건강알림 KDCA

‘여행건강알림e’에서 감염병 정보,
국제공인 예방접종 기관 확인하기

Check for disease updates and find
certified vaccination centers through
“Travel Health Alert.”



방충망, 모기장, 기피제 사용

Use window screens, mosquito nets,
and insect repellents.



외출시 긴팔·긴바지로 노출 최소화

Wear long sleeves and pants to
minimize skin exposure when outdoors.

※ 여행 후 자신의 건강상태 2주 동안 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 1339 콜센터로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 2 weeks after travel. If you show any symptoms, call 1339 for advice.